

使用说明
TYRVAYA® (Teer-vye-ah)
(varenicline solution)
鼻腔喷剂，用于鼻内使用

使用 TYRVAYA 前和每次续药时，请先阅读本说明书。有可能会有新的信息。本信息不能取代与您的医疗保健提供者讨论您的医疗状况或治疗。

使用 TYRVAYA 前您需要了解的重要信息：

- TYRVAYA 用于鼻腔内。
- 请勿摇晃瓶身。
- TYRVAYA 纸盒中含有足够 30 天使用的药物。
 - 每盒有 2 个玻璃瓶装的鼻腔喷剂。
 - 每瓶鼻腔喷剂有足够用于 15 天治疗的药物。
 - 在您用完第一瓶之前，**请勿**打开第二瓶鼻腔喷剂。


TYRVAYA 鼻腔喷剂的组成物品：



首次使用 TYRVAYA 前的准备处理步骤

步骤 1. 去除瓶盖和夹套。

请勿扔掉瓶盖或夹套。每次使用完毕后，瓶盖和夹套需要放回鼻腔施药器上。



步骤 2. 将喷鼻剂瓶直立拿着，并远离您的脸部。将 1 只手指放在鼻腔施药器底部的每侧，并将您的拇指放在瓶身下方。



步骤3. 用您的拇指和其他手指完全按压和松开鼻腔施药器7次，将喷鼻剂瓶灌注。您可能会感到一些阻力，但一定要完全按下。当您按压和松开鼻腔施药器时，您不一定每次都会看见有喷雾释放。第七次按下并松开时，您应该会看到喷雾。喷洒时请朝外和远离他人。

TYRVAYA 现在灌注完毕，可供使用。



- **重新灌注：**如果您超过**5天**没有使用TYRVAYA，则需要在使用前按压**1次喷雾**以重新灌注喷鼻剂瓶。如要重新灌注喷鼻剂瓶，将其直立握着并远离您的脸部，然后**完全按压**并松开鼻腔施药器**1次**。
- **如何避免给喷鼻剂瓶灌注超过需要的量：**如果进行多余的鼻腔喷雾器灌注，将会减少喷鼻剂瓶中的药量。


灌注后使用 TYRVAYA 鼻腔喷剂的步骤

步骤 1. 视需要擤鼻涕，以清理鼻孔。



步骤 2. 去除瓶盖和夹套。


请勿扔掉瓶盖或夹套。每次使用完毕后，瓶盖和夹套需要放回鼻腔施药器上。



步骤 3. 将喷鼻剂瓶直立拿着。将 1 只手指放在鼻腔施药器底部的每侧，并将您的拇指放在瓶身下方。



步骤 4. 将您的头部稍微向后倾斜，无需躺下。



步骤 5. 将鼻腔施药器插入左边或右边的鼻孔。将鼻腔施药器倾斜，并将鼻腔施药器顶端指向与鼻孔同侧的耳朵顶部。

请勿将鼻腔施药器顶端按压在鼻腔内壁上。在鼻腔施药器顶端与鼻腔内壁之间保留一些间隙。



步骤 6. 将您的舌头放在口腔上颚，在完全按压和松开鼻腔施药器1次的同时，轻柔地呼吸，以将喷雾释放入您的鼻腔中。

重复步骤 5 和 6，以在另一个鼻孔进行第二次喷雾给药。



步骤 7. 使用清洁的纸巾擦拭鼻腔施药器。



步骤 8. 将夹套和瓶盖重新放好。

每次使用 TYRVAYA 时，请重复步骤 1 至步骤 8。



本使用说明已经由美国食品和药物管理局批准。

TYRVAYA®是 Viatris 旗下 Oyster Point Pharma, Inc.公司的注册商标。

TYRVAYA®和/或 TYRVAYA®在某一方法中的使用可能由一项或多项专利或专利申请所涵盖，详情可在 www.oysterpointrx.com/patent-notice 查阅。

为以下公司制造：Oyster Point Pharma, Inc., 202 Carnegie Center, Suite 106, Princeton, NJ 08540

©2023 Oyster Point Pharma, Inc.

修订日期：2/2024

TYR-2024-0058 3/24