

**Hướng dẫn sử dụng**  
**TYRVAYA®** (Teer-vye-ah)  
**(varenicline solution)**  
**xịt mũi, dùng qua đường mũi**

Đọc Hướng dẫn sử dụng này trước khi bắt đầu sử dụng TYRVAYA và mỗi lần nhận thêm thuốc. Có thể có thông tin mới. Thông tin này không được sử dụng để thay cho tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hoặc điều trị.

**Thông tin quan trọng cần biết trước khi sử dụng TYRVAYA:**

- **TYRVAYA dùng qua đường mũi.**
- **Không lắc lọ thuốc.**
- Một hộp TYRVAYA chứa thuốc đủ dùng trong 30 ngày.
  - o Mỗi hộp có 2 lọ thuốc xịt bằng thủy tinh.
  - o Mỗi lọ thuốc xịt mũi có đủ thuốc cho 15 ngày điều trị.
  - o **Không** mở lọ xịt thứ hai khi vẫn chưa dùng hết lọ xịt thứ nhất.


**Các bộ phận của lọ xịt mũi TYRVAYA:**



**Các bước mỗi TYRVAYA trước khi sử dụng lần đầu**

**Bước 1.** Tháo nắp và vòng kẹp.


**Không** vất bỏ nắp hoặc vòng kẹp. Nắp và vòng kẹp sẽ được dùng để đóng ống xịt sau mỗi lần sử dụng.



**Bước 2.** Giữ lọ xịt thẳng đứng và cách xa mặt. Đặt 1 ngón tay vào mỗi bên của phần dưới ống xịt và để ngón cái dưới lọ chứa.



**Bước 3.** Thực hiện mỗi lọ xịt mũi bằng cách dùng ngón cái và các ngón tay để ấn **hết cỡ** và thả ống xịt 7 lần. **Bạn có thể cảm thấy hơi căng một chút nhưng hãy nhớ ấn hết cỡ.** Không phải lần nào cũng xịt được thuốc khi bạn ấn và thả ống xịt. Nhưng tối đa 7 lần ấn và thả bạn sẽ xịt được. Không xịt về phía bạn và người khác.



TYRVAYA hiện đã được mời để sử dụng.

- **Mỗi lại:** Nếu bạn không dùng TYRVAYA trong hơn **5 ngày**, bạn sẽ cần mỗi lại lọ xịt bằng **1 lần xịt** trước khi bắt đầu sử dụng. Để mỗi lại, giữ lọ xịt thẳng đứng và cách xa mặt, sau đó ấn **hết cỡ** và thả ống xịt **1 lần**.
- **Để tránh mỗi lọ xịt nhiều hơn cần thiết:** Mỗi lọ xịt nhiều hơn cần thiết sẽ làm giảm lượng thuốc trong lọ xịt.


### Các bước để sử dụng thuốc xịt mũi TYRVAYA sau khi mỗi

**Bước 1.** Xì mũi để làm thông thoáng lỗ mũi, nếu cần.



**Bước 2.** Tháo nắp và vòng kẹp.


**Không** vứt bỏ nắp hoặc vòng kẹp. Nắp và vòng kẹp sẽ được dùng để đóng ống xịt sau mỗi lần sử dụng.



**Bước 3.** Giữ lọ xịt mũi thẳng đứng. Đặt 1 ngón tay vào mỗi bên của phần dưới ống xịt và để ngón cái dưới lọ xịt.



**Bước 4.** Hơi ngửa đầu ra sau mà không cần nằm.




**Bước 5.** Đặt ống xịt vào mũi bên trái hoặc bên phải. Nghiêng ống xịt và hướng đầu của ống xịt về phía đỉnh tai cùng phía với mũi của bạn.

**Không** ấn đầu ống xịt vào thành bên trong của mũi. Giữ khoảng cách giữa đầu ống xịt và thành bên trong của mũi.



**Bước 6.** Để lưỡi lên vòm miệng và thở nhẹ khi ấn **hết cỡ** và thả ống xịt **1 lần** để thuốc đi vào trong mũi.

Lặp lại bước 5 và 6 để xịt lần 2 vào mũi bên kia.




**Bước 7.** Dùng khăn sạch để lau ống xịt.



**Bước 8.** Lắp lại vòng kẹp và nắp.

**Lặp lại bước 1 đến 8 mỗi lần bạn sử dụng TYRVAYA.**



Hướng dẫn sử dụng này đã được phê duyệt bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

TYRVAYA® là thương hiệu đã đăng ký của Oyster Point Pharma, Inc., một Công ty thuộc tập đoàn Viatrix.

TYRVAYA® và/hoặc sử dụng TYRVAYA® theo phương pháp có thể được đề cập trong một hay nhiều bằng sáng chế hoặc hồ sơ xin cấp bằng sáng chế, có sẵn tại [www.oysterpointrx.com/patent-notice](http://www.oysterpointrx.com/patent-notice).

Được sản xuất cho: Oyster Point Pharma, Inc., 202 Carnegie Center, Suite 106, Princeton, NJ 08540

©2023 Oyster Point Pharma, Inc.

Chỉnh sửa: 2/2024

TYR-2024-0063 3/24