

환자 정보

TYRVAYA® (Teer-vye-ah)
(varenicline solution)

콧 구멍 속에 사용하는 비강 스프레이

TYRVAYA 는 무엇인가요?

TYRVAYA 는 안구 건조증 징후와 증상 치료 처방에 사용되는 비강 스프레이입니다.

TYRVAYA 사용하기 전 의료진에게 다음을 포함한 자신의 건강관련 사항들에 대해 알려야 합니다.

- 임신 중이거나 임신 계획이 있는지 여부. TYRVAYA 가 태아에게 해를 끼치는지 여부는 알려진 바 없습니다.
- 모유 수유 중이거나 모유 수유 계획이 있는지 여부. TYRVAYA 가 모유에 영향을 주는지 여부는 알려진 바 없습니다. 모유 수유를 계획 중이라면, 귀하와 담당 의료진이 TYRVAYA 사용 여부를 결정해야 합니다.

처방 및 비처방 의약품, 비타민, 허브 보충제를 포함하여 귀하가 복용 중인 모든 약에 대해 의료진에게 알려주십시오.

자신이 복용하는 약을 알아야 합니다. 새로운 약을 받기 전 의료진 및 약사에게 보여줄 복용약 목록을 보관하십시오.

TYRVAYA 는 어떻게 사용해야 하나요?

- TYRVAYA 의 올바른 사용법에 대한 정보는 본 환자 정보지 하단 사용 안내를 참조하십시오.
- 코 안에 TYRVAYA 분무 후 눈물 생성량이 증가합니다.
- TYRVAYA 는 의료진이 말해준 사용법대로 정확히 사용하십시오.
- 약병을 흔들지 마십시오.
- TYRVAYA 는 각 콧구멍에 한 번씩 하루 2 회(약 12 시간 간격) 분무하십시오.
- 한달치 TYRVAYA 는 비강 스프레이 약병 두개로 되어있습니다. 첫 번째 약병을 모두 사용한 다음 두 번째 약병을 개봉하십시오. TYRVAYA 는 흰색 비강 펌프와 파란색 먼지덫개로 된 유리병에 담겨있습니다.
- 만일 TYRVAYA 를 투여하지 못한 경우는 해당 용량을 건너뛰고 계획된 시간에 맞춰 정해진 양을 분무하십시오. 투여하지 못한 용량을 보충하기 위해 추가 용량을 분무하지 마십시오.

TYRVAYA 부작용으로 어떤 것이 있을 수 있나요?

TYRVAYA 의 가장 흔한 부작용은 재채기, 기침, 인후두와 코 자극입니다.

TYRVAYA 의 부작용은 이것만이 아닙니다. 부작용에 대한 의학적 조언은 의사에게 문의하십시오.

부작용은 1-800-FDA-1088 로 FDA 에 보고할 수도 있습니다.

TYRVAYA 는 어떻게 보관해야 하나요?

- TYRVAYA 는 화씨 68 도에서 77 도(섭씨 20 도에서 25 도) 사이 상온 보관하십시오.
- 얼리지 마십시오.
- TYRVAYA 비강 스프레이 약병은 처음 사용한 날로부터 30 일이 지나면 버리십시오.

TYRVAYA 와 모든 의약품은 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

TYRVAYA 안전 및 효과적 사용 관련 일반 정보.

약은 환자 정보지 기재 내용과 다른 목적으로 처방되는 경우가 간혹 있습니다. TYRVAYA 를 처방받은 증상 이외로는 사용하지 마십시오. 다른 사람이 유사 증상을 보이더라도 가지고 있던 TYRVAYA 를 건네지 마십시오. 다른 사람에게는 해가 될 수 있습니다. 담당 약사나 의료진에게 의료 전문가 용으로 작성된 TYRVAYA 정보에 대해서 요청할 수 있습니다.

TYRVAYA 의 성분은 무엇인가요?

활성 성분: 주석산 바레니클린

비활성 성분: 제 2 인산나트륨 헵타수화물, 제 1 인산 무수나트륨, 염화나트륨, 수산화나트륨 및/또는 염산(pH 조정용) 및 주입용 물.

TYRVAYA®는 Viatrix 의 자회사인 Oyster Point Pharma, Inc.의 등록 상표입니다.

TYRVAYA® 및/또는 하나 이상의 특허 또는 특허 출원의 적용을 받는 TYRVAYA® 사용은 www.oysterpointrx.com/patent-notice 에서 확인할 수 있습니다.

제조대상: Oyster Point Pharma, Inc., 202 Carnegie Center, Suite 106, Princeton, NJ 08540

본 환자 정보는 미국 식품의약품 승인을 받았습니다

개정: 2/2024

TYR-2024-0053 3/24